

8.2.1.

8.2.2.



«Утверждаю»  
Главный врач  
И.Х. Хайдаров  
01.04.2020 г.

**Инструкция № 63**  
**по надеванию и раздеванию противочумного костюма**

**Порядок надевания комплекта средств индивидуальной защиты**

Комплект надевают до входа в очаг инфекционного заболевания в определенной последовательности, тщательно, чтобы удобно было в нем работать в течение 3-4 часов:

1. Обработать руки спиросодержащим антисептиком
2. Надеть шапочку (чепчик).
3. Надеть первую пару перчаток
4. Надеть брюки комбинезона;
5. Надеть рукава комбинезона
6. Надеть бахилы или сапоги, заправив под них брюки, завязать завязки бахил;
7. Надеть респиратор, сделать вдох и выдох
8. Надеть очки, предварительно натерев с внутренней стороны стекла маски сухим мылом (для предупреждения запотевания).
9. Надеть капюшон комбинезона.
10. Застегнуть текстильную застежку комбинезона снизу вверх, равномерно надавливая верхнюю часть на нижнюю.
11. Надеть вторую пару перчаток.
12. Сверху комбинезона надеть одноразовый синий халат;
13. Вставить за пояс халата полотенце.

## Порядок снятия и обеззараживания комплекта средств индивидуальной защиты


Комплект снимают после работы в специально выделенном для этого помещении, после полного его обеззараживания.

Комплект снимают только самостоятельно, очень медленно, осторожно, по возможности, перед зеркалом.

1. Тщательно, в течение 1-2 минут, моют руки в перчатках в 3% растворе хлорамина (в дальнейшем руки обрабатывают в 3% растворе хлорамина после каждой манипуляции).
2. Медленно снимают полотенце, погрузить в емкость с дезинфицирующим раствором.
2. Снимают одноразовый халат, погрузить его в емкость для отхода класса «В» с дез.раствором .
4. Снимают верхние перчатки, погрузить в емкость с дезинфицирующим раствором, отходы класса «В».
5. Снимают бахилы (или сапоги), развязав завязки, погружают их в емкость с дезинфицирующим раствором, отходы класса «В»..
6. Расстегивают текстильную застежку на комбинезоне.
7. Снимают капюшон.
8. Снимают рукава, брюки комбинезона. Сворачиваю комбинизхон так, чтобы внутренняя часть оказалась снаружи. Сложить комбинизон в емкость отхода класса «В».
9. Снимают очки, погружают в дезинфицирующий раствор.
10. Снимают респиратор с фильтром, оттягивая двумя руками вперед, вверх и назад. Респиратор погружают в дезинфицирующий раствор, фильтр помещают в мешок класса В.
11. Снимают перчатки, проверяют их целостность в дезинфицирующем растворе, погрузить емкость отхода-класса «В».
12. Обработать руки моют руки спиртосодержащим антисептиком.
13. Обработать горло 70 % спиртом.
14. Закапать в глаза, нос 2% раствор борной кислоты.

Заместитель главного врача  
по медицинской части

Врач-эпидемиолог Лутфиева Р.М.  
Главная медсестра Мамаева М.Г.



А.В. Дмитриев